

Czech Agriculture National Demonstrator (CzechAgri)

Kučera, Luboš; Vobora, Václav (GISAT, Czech Republic)

Šavelková, Lucie (SZIF, Czech Republic)

Defourny, Pierre (Université Catholique de Louvain, Belgium)

Koetz, Benjamin (ESA ESRIIN, Italy)

Léo, Olivier; Lemoine, Guido (Joint Research Centre, Italy)

Obsah prezentace

- Kontext projektu
- Technická specifikace produktu
- Družicová data
- Klasifikace & validace 2015
- Klasifikace & validace 2015/2016
- Závěr & další aktivity

Kontext projektu

- Studie iniciována v prosinci 2015 společně DG-JRC, ESA and SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
- Řešena v rámci projektu ESA „Sentinel-2 for Agriculture“ vedeném Université Catholique de Louvain
- Demonstrovat možnosti družic Sentinels pro zemědělský monitoring a management v České republice
- Ověřit koncept mapování zemědělských plodin na celostátní úrovni



→ AGRICULTURE



Technická specifikace produktu

Specifikace produktu

- Prostorové pokrytí: Celostátní až regionální
- Prostorové rozlišení: 20 metrů / DPB (polygon LPIS)
- Časový rozsah: Celé vegetační období
- Časová frekvence: 2-4 mapy během 1 vegetačního období
- Geometrická přesnost: RMS < 20m
- Tématická přesnost: Celková přesnost > 80%
Přesnost pro jednotlivé plodiny > 60% (F1-score)
- Formát: ArcInfo SHP
- Mapová projekce: Křovák / S-JTSK

Vstupní data

- Družicové snímky
 - Časová řada Sentinel-1 & 2
 - Časová řada Landsat 7 & 8
- Hranice zemědělských ploch
 - LPIS
- In-situ data o plodinách
 - Data z pozemního šetření, data z dotačních žádostí



Czech National Crop Type Map: mapping crop types using an automated approach

Product rationale

The crop type product intends to demonstrate as a proof-of-concept the capabilities of the Copernicus Sentinels for agricultural monitoring at national scale of the Czech Republic. The main aim of the crop type product is to support the national Czech Paying Agency (The Czech State Agriculture Intervention Fund, SZIF) in its activities related to the administration and control of subsidies within the EU's Common Agricultural Policy. The focus is to support the control of direct payments and the compliance with the sustainable agriculture practices. This proof-of-concept is implemented in close cooperation with the DG-IRG, SZIF as well as involving DG-Grow and DG-Agri in response of the recently published EC concept note "A Roadmap for Future Copernicus Service Components in support to Agriculture" ¹.

The primary list of crops includes winter cereals, winter rapeseed, spring cereals, maize, sugar beet, potatoes and fodder crops. Other crops may be added. The crop type mapping will provide operationally several iterative updates since the start of the crop growing seasons. The series of crop type maps shall be produced based on the Czech State Agricultural Intervention Fund requests. The thematic content and accuracy of the map will vary according to the provision date and the user's needs.


¹ EC Document of 5 April 2016 ref. Ares (2016) 1613477, prepared by the Joint Research Centre at the request of DG-GROW and presented to EU Member States during the Copernicus User Forum of 19 April 2016 in Brussels.



Example of summer composite based on Sentinel-2 imagery overlaid by the LPIS database (area eastern of Prague)

Product specifications

- Spatial coverage: Full country to regional
- Spatial resolution: 20 meters / LPIS polygons
- Temporal extent: Whole crop growing season
- Temporal frequency: 2-4 crop type maps per crop growing season
- Geometric accuracy: RMS < 20m
- Thematic accuracy: Overall accuracy > 80%
Individual crop accuracy > 60% (F1-score)
- Format: ArcInfo SHP
- Cartographic projection: Krovák / S-JTSK
- Metadata: XML file



Mapa zemědělských plodin 2015


- Celá ČR
- Vyhodnocení časové řady Sentinel-1 & 2 and Landsat 7 & 8
- Ozimé obiloviny, řepka ozimá, jarní obiloviny, kukuřice, cukrovka, brambory a píce
- Časový rozsah: Celé vegetační období

Mapa ozimých plodin 2016

- Regionální (východní část středních Čech)
- Vyhodnocení časové řady Sentinel-2
- Ozimé obiloviny, řepka ozimá, píce (zahrnuje mapu LAI)
- Časový rozsah: Březen 2016

Mapa zemědělských plodin 2016


- Celá ČR
- Vyhodnocení časové řady Sentinel-1 & 2 (doplněné Landsat 8)
- V přípravě



Družicová data

- Landsat-7 ETM+, Landsat-8 OLI: říjen 2014 – prosinec 2015
- L7 z archívu USGS, L8 z archívu ESA
- 12 paths/rows pro ČR, 675 scén (357 L7 ~ 80GB, 318 L8 ~ 300GB)
- Konverze DN to TOA, atmosférické korekce (6S), výběr spektrálních pásem (blue, green, red, nir, swir1, swir2)
- Detekce oblačnosti/stínů/sněhu pomocí Fmask
- Multitemporální kompozity: bezoblačná mozaika, období 1-3 měsíců – březen 2015, duben - červen 2015, červenec – září 2015

Počet bezoblačných hodnot (zelená = 1, červená > 10)




Landsat 7/8: Multitemporální kompozity

březen 2015


duben – červen 2015

červenec – září 2015




- Sentinel-1 GRD IW, říjen 2014 – prosinec 2015, operational SciHub, 763 scenes ~ 885GB
- Předzpracování SAR dat (S1 a SNAP toolbox)


- Kalibrace na sigma-naught
- Terénní korekce a ortorektifikace
- Speckle filtering (Lee Speckle Filter)
- Konverze do dB scale
- Výběr vhodných snímků pomocí meteorologických dat a vizuální interpretace
- Měsíční kompozity pomocí SNAP



Sentinel-1: měsíční kompozit (leden 2015)



- Identifikováno 5 orbitů přes ČR, zpracování dat S2 pořízených před koncem listopadu 2015, celkem 22 granulí ~ 11 GB
 - SEN2COR - atmosférické korekce
 - Překódování masek oblačnosti, všechny zpracovatelské kroky řešeny ve SNAP
 - „letní“ kompozit: srpen - září 2015





→ AGRICULTURE



Klasifikace & validace 2015

- LPIS poskytnut MZe
- LPIS ČR - založen na půdních (farmářských) blocích
- Verze platná k 1.6.2015

- Celková plocha orné půdy: 2 488 892 ha
- Celkový počet dílů půdních bloků: 242 748 polygons

- MMJ - 1ha, ve 20 m rozlišení odpovídá 25 px
- Data LPIS - orná půda, výměra dílu půdního bloku ≥ 1 ha
- Masky orné půdy odvozena z LPIS
- Představuje 2 466 350 ha (99.1% celkové plochy orné půdy)


- Poskytnuta SZIF
- Vzorek zemědělských parcel z roku 2015
- Jedna plodina na jednom dílu půdního bloku
- Výměra větší než 2 ha
- Plodina ze žádosti potvrzena kontrolou v terénu
- Vzorek vybrán pouze na orné půdě

- Stratifikovaný náhodný výběr
 - 10 plodin
 - 7 plodinových skupin





 - 4 491 dílů půdních bloků
 - 2 294 poskytnuty Gisatu (2/3)


- Založen na algoritmech Support Vector Machine (SVM)
- Klasifikace provedena pod maskou orné půdy odvozenou z LPIS
- Integrace vyhodnocení optických a radarových dat
 - Fúze před klasifikací (kombinace příznaků)
 - jednodušší z operačního pohledu
 - Fúze po klasifikaci (kombinace tříd)
 - lepší pro řešení smíšené klasifikace a identifikaci více plodin na jednom DPB
- Dvě nezávislé klasifikace:
 - Optická data - vyhodnocení multitemporálních kompozitů Sentinel-2 a Landsat 7 & 8
 - SAR - vyhodnocení měsíčních kompozitů Sentinel-1
- Integrace - vylepšená mapa plodin s vyšší tématickou přesností - využívá maximální posteriorní pravděpodobnost v rámci DPB
- Agregace - plodina s největší plochou v rámci DPB

- Vývoj odrazivosti pro jednotlivé plodiny v průběhu vegetačního období



- Odrazivost pro jednotlivé plodiny
 - Statistický test: Generalized linear models (GLMs), Analysis of Variance (ANOVA) and Tukey's HSD - identifikace plodin (skupiny plodin), které mají výrazně odlišný rozsah odrazivosti v průběhu vegetačního období





- Interní validace - zpracoval Gisat, validační vzorek: 866 DPB

Třída	Plodina / skupina plodin	Users accuracy	Producers accuracy	F1 score
1	řepka ozimá	94%	97%	96%
2	ozimé obiloviny	92%	98%	95%
3	jarní obiloviny	84%	86%	85%
4	cukrovka	100%	100%	100%
5	kukuřice	81%	94%	88%
6	brambory	85%	79%	82%
7	pícniny	86%	68%	77%
8	ostatní plodiny	71%	40%	56%
Průměr		87%	83%	85%

Celková přesnost	88%
-------------------------	------------

Confusion matrix									
Třída	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1	114	2	1	0	0	0	0	0	117
2	3	361	4	0	0	0	1	0	369
3	2	18	158	0	0	0	1	5	184
4	0	0	0	8	0	0	0	0	8
5	0	2	0	0	48	0	0	1	51
6	0	0	0	0	1	11	0	2	14
7	0	9	4	0	2	0	38	3	56
8	2	2	22	0	8	2	4	27	67
Total	121	394	189	8	59	13	44	38	866

- Externí validace - zpracoval SZIF, validační vzorek: 1485 DPB

Třída	Plodina / skupina plodin	Users accuracy	Producers accuracy	F1 score
1	řepka ozimá	95%	97%	96%
2	ozimé obiloviny	89%	98%	93%
3	jarní obiloviny	85%	87%	86%
4	cukrovka	89%	89%	89%
5	kukuřice	84%	90%	87%
6	brambory	89%	80%	84%
7	pícniny	85%	55%	70%
8	ostatní plodiny	67%	41%	54%
Průměr		85%	80%	82%

Celková přesnost	87%
-------------------------	------------

Confusion matrix									
Třída	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1	185	3	1	0	0	0	1	0	190
2	3	610	7	0	3	0	1	1	625
3	2	31	274	0	0	0	2	7	316
4	0	1	0	16	0	0	0	1	18
5	0	4	0	0	87	0	2	4	97
6	0	0	1	0	1	24	0	4	30
7	0	26	11	0	3	0	56	5	101
8	4	12	29	2	10	3	4	44	108
Total	194	687	323	18	104	27	66	66	1485

gisat Porovnání vyhodnocení optických a radarových dat

■ Klasifikace optických dat - vzorek z interní validace

Třída	Plodina / skupina plodin	Users accuracy	Producers accuracy	F1 score
1	řepka ozimá	95%	91%	93%
2	ozimé obiloviny	92%	98%	95%
3	jarní obiloviny	82%	87%	84%
4	cukrovka	100%	100%	100%
5	kukuřice	82%	90%	86%
6	brambory	85%	79%	82%
7	pícniny	75%	70%	72%
8	ostatní plodiny	58%	33%	45%
Průměr		84%	81%	82%

Celková přesnost 87%

Confusion matrix									
Třída	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1	106	8	0	0	0	0	3	0	117
2	3	360	5	0	0	0	1	0	369
3	1	13	160	0	0	0	3	7	184
4	0	0	0	8	0	0	0	0	8
5	0	0	1	0	46	0	2	2	51
6	0	0	0	0	1	11	0	2	14
7	0	7	3	0	2	0	39	5	56
8	2	3	27	0	7	2	4	22	67
Total	112	391	196	8	56	13	52	38	866

■ Klasifikace radarových dat - vzorek z interní validace

Třída	Plodina / skupina plodin	Users accuracy	Producers accuracy	F1 score
1	řepka ozimá	91%	99%	95%
2	ozimé obiloviny	85%	95%	90%
3	jarní obiloviny	81%	74%	78%
4	cukrovka	80%	100%	90%
5	kukuřice	73%	86%	80%
6	brambory	73%	57%	65%
7	pícniny	79%	54%	66%
8	ostatní plodiny	65%	36%	50%
Průměr		78%	75%	77%


Celková přesnost 83%

Confusion matrix									
Třída	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1	116	0	1	0	0	0	0	0	117
2	5	352	8	1	2	0	0	1	369
3	1	39	137	0	1	0	0	6	184
4	0	0	0	8	0	0	0	0	8
5	0	2	0	0	44	0	3	2	51
6	1	2	0	0	2	8	0	1	14
7	1	10	9	0	3	0	30	3	56
8	3	9	14	1	8	3	5	24	67
Total	127	414	169	10	60	11	38	37	866


- Jediná plodina je deklarována na jednom DPB ve více než 80% všech DPB
- DPB s více plodinami je nutné detekovat automaticky (a je nutné je odlišit od DPB, na kterých je více plodin klasifikováno chybně)
- Dvoufázový přístup
 - Statistická analýza
 - Segmentace v rámci DPB
- Úvodní test
 - Statistická analýza založená na aplikaci minimální plochy zemědělské parcely a výpočtu podílů klasifikovaných plodin
 - Aplikováno na validační vzorek: pro 1481 DPB deklarováno více plodin, více než 90% identifikováno statistickým přístupem
 - Ale stále zůstává mnoho DPB s chybně klasifikovanými více plodinami
 - Objektově založený přístup musí být vyvinut a otestován

Více plodin na jednom dílu půdního bloku I


březen 2015




duben - červen 2015




srpen - září 2015




- Více plodin na jednom DPB potvrzeno
- Příklad „jednoduché“ detekce




březen 2015



duben - červen 2015




srpen - září 2015




- Chybná klasifikace - více plodin na jednom DPB nepotvrzeno
- Příklad „komplikované“ detekce




březen 2015




duben - červen 2015



srpen - září 2015




- Více plodin vs. vegetační anomálie uvnitř DPB
- Příklad „komplikované“ detekce




Klasifikace & validace 2015/2016

- Pouze Sentinel-2 – kompozit založen dvou snímci (březen 17/27)
- Ukázka regionálního produktu – východní část středních Čech
 - Řepka ozimá, ozimé obiloviny, píce, bez vegetace
 - Mono-temporální klasifikace, stejný přístup jako pro rok 2015
 - Trénovací množiny pořízeny pomocí vizuální interpretace
 - Validací vzorek pořízen během terénního šetření



- Kompozit Sentinel-2, klasifikace SVM, agregace na DPB









- Interní validace - zpracoval Gisat, validační vzorek: 137 DPB
- Validační data pořízena během terénního šetření

Třída	Plodina / skupina plodin	Users accuracy	Producers accuracy	F1 score
1	řepka ozimá	89%	81%	85%
2	ozimé obiloviny	90%	98%	94%
7	pícniny	95%	75%	85%
8	bez vegetace	88%	96%	92%
Průměr		91%	88%	89%

Celková přesnost	91%
-------------------------	------------

Confusion matrix					
Třída	1	2	7	9	Total
1	17	3	0	1	21
2	0	64	1	0	65
7	2	3	21	2	28
9	0	1	0	22	23
Total	19	71	22	25	137

- Chybná detekce řepky ozimé – zpožděný vegetační vývoj, bude vyřešeno zařazením později pořízených snímků



Závěr & další aktivity

- Vysoká přesnost klasifikace založené na radarových datech Sentinel-1
- LPIS musí být k dispozici
- Převážně automatické zpracování (nebyly aplikovány žádné manuální post-klasifikační úpravy)
- Musí být zpracováno obrovské množství dat (1.3 TB pro jedno vegetační období - nárůst pro rok 2016)
- Klasifikace ozimých plodin je možná již v březnu s vysokou přesností (při vyhodnocení optických dat)

- Klasifikace plodin v roce 2016
 - Kompletní časová řada Sentinel-2
 - Přesnost pro jednotlivé plodiny vs. doba klasifikace
 - Simulace postupné iterativního produkce v průběhu vegetačního období

- Automatická detekce více plodin na jednom DPB
- Integrace vyhodnocení optických a radarových dat

Poděkování

- ESA: iniciativa CzechAgri, financování prostřednictvím projektu Sentinel-2 for Agriculture
- UCL: vedení projektu, podpora vyhodnocení 2015/2016
- DG-JRC: “Towards Future Copernicus Services Components for Agriculture”
- SZIF: poskytnutí dat ze žádostí, externí validace, konzultace
- MoA: poskytnutí LPIS